

اطلاعات در مورد واکسن کورونا

ویروس کورونا

ویروس کورونا (SARS-CoV-2) از انسان به انسان انتقال می یابد و موجب بیماری کووید-19 می گردد. همه مردم در هر سنی ممکن است به این بیماری کورونا مبتلا شوند.

این بیماری از چندین روز تا چندین هفته طول کشیده و موجب ناراحتی های مانند تب، سرفه، از دست رفتن حس بویایی و چشایی و تنگی نفس می شود.

در حالت شدید آن، این بیماری موجب التهاب مجاری تنفسی و دیگر اعضای بدن می شود که ممکن است برای مداوا، نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه باشد. بیماری کورونا ممکن است عواقب درازمدت داشته و حتی منجر به مرگ شود. واکسیناسیون بهترین روش جلوگیری از بیماری کورونا می باشد.

چرا شما بایستی واکسن بزنید؟

واکسن از ابتلای شما به حالت شدید بیماری کووید-19 جلوگیری می کند.

واکسن چگونه موثر می باشد؟

واکسن بدن شما را به تولید پادتن تحریک می کند. در صورتی که شما در تماس با ویروس کووید-19 (SARS-CoV-2) قرار بگیرید، این پادتن ها مانع از ابتلای شما به نوع شدید بیماری می شوند. واکسن حداقل شش ماه از ابتلای شما به نوع شدید بیماری جلوگیری می کند. اگر در موارد استثنایی، شما با وجود واکسیناسیون به بیماری کووید-19 مبتلا شوید، روند بیماری بسیار خفیف بوده و از عوارض مضاعف و مرگ پیشگیری می شود.

واکسن ها خود حاوی ویروس (SARS-CoV-2) نبوده و لذا امکان ندارد که شما به خاطر زدن واکسن به کووید-19 مبتلا شوید.

آیا زدن واکسن مطمئن است؟

بله. این مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است: مواد واکسن موثر و مطمئن می باشند. تمامی واکسن های کووید-19 که در اروپا دارای مجوز می باشند، به صورت فراگیر آزمایش شده اند و مرتباً تحت کنترل شدید می باشند. اداره داروی اروپا (Europäische Arzneimittelbehörde EMA) به همین دلیل مجوز برای واکسن ها صادر کرده است.

چه کسی می تواند واکسن زده شود؟

زدن واکسن برای اشخاص از سن بالای 5 سال ممکن می باشد.

همچنین اشخاصی که مبتلا به پیش بیماری (مانند مرض قند، فشار خون، بیماری های قلبی، آسم) می باشند، می توانند واکسن زده شوند. شما می توانید از پیش با پزشک خود در مورد واکسیناسیون مشورت کرده و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید واکسن زده شوید.

همچنین اشخاصی که دچار حساسیت (مانند حساسیت به مواد غذایی، حساسیت به گرده ی درختان و یا گرد و خاک، ناسازگاری یا آنتی بیوتیک ها) می باشند، می توانند واکسن زده شوند، چون این واکسن ها حاوی این مواد نمی باشند. لطفاً در حین گفتگوی توجیهی خود، به پزشک بگویید که حساسیت دارید و کارت حساسیت خود را به همراه داشته باشید.

چه کسانی نباید واکسن زده شوند؟

اگر شما در حال حاضر مبتلا به یک بیماری عفونی شدید با دمای بالای بدن (بالای 38 درجه) می باشید، لطفاً با پزشک خود قبل از زدن واکسن مشورت کنید.

اگر شما باردار بوده و یا فکر می کنید که باردار هستید و یا تصمیم به بارداری دارید، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید.

اگر شما در حال حاضر به بیماری کووید-19 مبتلا می باشید (تا 4 هفته پس از اولین آزمایش مثبت PCR)

آیا کسانی که قبلاً مبتلا به بیماری کووید-19 بوده اند، بایستی واکسن زده شوند؟

پس از ابتلا به بیماری کووید-19، شما ممکن است دوباره مبتلا شوید. بنابراین بهتر است که کسانی که قبلاً بیماری کووید-19 داشته اند، واکسن زده شوند.

بهتر است که زدن واکسن حداقل 4 هفته پس از بیماری انجام بگیرد.

کجا و چگونه می توانم واکسن زده شوم؟

واکسیناسیون در محل های مختلف انجام می گیرد. به شما به موقع اطلاع داده خواهد شد که کجا و چه زمانی می توانید واکسن بزنید.

زدن واکسن به چه صورت انجام می گیرد؟

زدن واکسن داوطلبانه می باشد. شما برای زدن واکسن نباید هزینه ای پرداخت کنید.

قبل از زدن واکسن، به شما یک پرسش نامه (Aufklärungsbogen) داده می شود که شما باید پر کنید. اگر سوالاتی در مورد واکسن دارید، می توانید قبل از زدن واکسن با پزشک مطرح کنید.

لطفاً در وقت واکسیناسیون، کارت بیمه خود e-Card (اگر دارید) و دفترچه واکسن خود را (اگر دارید) به همراه داشته باشید.

زدن واکسن از طریق تزریق به بازوی شما انجام می گیرد. آمپول حاوی ماده واکسن می باشد. پس از زدن واکسن، شما باید تقریباً 20 دقیقه در محل بمانید. اگر پس از تزریق واکسن، احساس کسالت می کنید، لطفاً به پزشک و یا پرستاران مرکز بگویید.

واکسن های مختلفی موجود می باشند که در چند نوبت تزریق می شوند. بین نوبت اول و نوبت دوم واکسن باید حداقل 21 روز فاصله زمانی باشد. تجدید واکسن چهار ماه پس از نوبت دوم واکسن در نظر گرفته شده است و بایستی حداکثر شش ماه پس از نوبت دوم تزریق شود.

آیا من می توانم نوع واکسن را انتخاب کنم؟

خیر، به شما آن واکسنی تزریق خواهد شد که موجود می باشد. ما در حال حاضر نمی دانیم که کدام خواهد بود.

آیا واکسن کووید-19 عوارض جانبی دارد؟

واکسن ممکن است که عوارض جانبی ناخوشایندی داشته باشد، از جمله درد، تورم و یا التهاب در محل تزریق. در بسیار اوقات، اشخاص پس از زدن واکسن احساس خستگی کرده و یا به عنوان مثال سردرد گرفته و یا تب خفیف می کنند. همچنین ممکن است حالت تهوع، استفراغ و یا لرز پیش بیاید.

این عوارض جانبی اما واکنشی معمولی نسبت به واکسن می باشند، زیرا بدن خود را برای مقابله با عامل بیماری آماده می کند. اکثراً این عوارض جانبی بعد از چند روز برطرف می شوند. از هر ده نفر که واکسن زده می شوند، بیش از یک نفر عوارض جانبی نشان می دهند.

آیا باید با وجود واکسیناسیون همچنان از ماسک FFP2 استفاده کنم؟

با وجود واکسیناسیون باید همچنان مقررات ایمنی مانند پوشش دهان و بینی / ماسک FFP2، فاصله از دیگران و دستورات بهداشتی را رعایت کنید.

اطلاعات بیشتر:

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html>

<https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html>

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-Schutzimpfung.html>