

ورقة معلومات حول التطعيم الوقائي ضد فيروس كورونا

فيروس كورونا

ينتقل فيروس كورونا (سارس-كوف 2) من شخص إلى آخر مسببا مرض كوفيد - 19. ويصيب مرض كورونا جميع الناس بغض النظر عن أعمارهم. ويمكن لهذا المرض أن يستمر عدة أيام وصولا إلى عدة أسابيع، حيث يمكن أن تصاحبه أعراض كالحمى والسعال وفقدان حاستي الشم والذوق وضيق التنفس. وفي حال كان مسار المرض حادا، تصاحبه التهابات في مجرى التنفس وأعضاء أخرى، مما يمكن أن يجعل العلاج في قسم العناية المركزة ضروريا. ويمكن أن يترتب على مرض كورونا عواقب بعيدة المدى، كما يمكن أن يكون قاتلا أيضا، مما يجعل التطعيم الحماية الأفضل ضد هذا المرض.

لماذا يجب عليك الحصول على اللقاح؟

يوفر لك اللقاح الحماية من الإصابة بمرض كوفيد - 19 بشكل حاد.

كيف يعمل اللقاح؟

يُحَفِّزُ اللقاح جسدك على تطوير أجسام مضادة. وتعمل هذه الأجسام المضادة على حمايتك من الإصابة بالمرض بشكل حاد في حال تعرضت إلى فيروسات كوفيد - 19 (سارس - كوف 2). ويوفر لك هذا اللقاح الحماية من التعرض إلى مسار مرضي حاد لمدة 6 أشهر على الأقل. وإذا تعرضت إلى الإصابة بمرض كوفيد - 19 في حالات استثنائية رغم تلقي اللقاح، يكون مسار المرض خفيفا بشكل ملحوظ، حيث يمكن تجنب حدوث مضاعفات وحالات وفاة. لا تحتوي اللقاحات على فيروس (سارس - كوف 2). وبالتالي، فلا يمكن حدوث إصابة بكوفيد - 19 بسبب اللقاح.

هل اللقاح آمن؟

نعم. لقد تم إجراء فحوصات على اللقاحات وتم التأكيد على أنها فعالة وآمنة. وتم اختبار جميع لقاحات كوفيد - 19 المرخصة في أوروبا باستفاضة، ولا تزال تخضع للرقابة الصارمة. لذلك، فقد قامت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بمنح الإذن لترخيص هذه اللقاحات.

من يمكنه تلقي اللقاح؟

يمكن للأشخاص ابتداء من سن 5 سنوات الحصول على اللقاح. ويمكن أيضا تطعيم الأشخاص المصابين بأمراض مسبقة (كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والربو). ويمكنهم دائما الحديث مع طبيبهم المسؤول حول التطعيم بشكل مسبق واتخاذ قرار فيما إن كانوا يريدون تلقي اللقاح. ويمكن أيضا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية (كالحساسية من المواد الغذائية أو الحساسية من حبوب اللقاح أو غبار المنزل أو عدم تحمل المضادات الحيوية) تلقي اللقاح لأنه لا يحتوي على هذه المواد. يرجى إبلاغ الطبيب عن الحساسية الموجودة لديك خلال الاستشارة التوضيحية وإحضار البطاقة الخاصة بالحساسية معك.

من لا يمكنه تلقي اللقاح؟

إن كنت تعاني من عدوى شديدة وحادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة (تتجاوز 38 درجة مئوية)، يرجى الحديث مع الطبيب المسؤول قبل تلقي اللقاح. إن كنت حامل أو تخططين للحمل، يرجى الحديث مع طبيبك المسؤول. إن كنت حاليا مصابا بكوفيد - 19 (حتى 4 أسابيع بعد أول فحص PCR إيجابي).

هل يترتب على الأشخاص الذي أصيبوا في وقت مسبق بكوفيد - 19 تلقي اللقاح؟

يمكنك بعد الإصابة بمرض كوفيد - 19 التعرض إلى العدوى مجددا. لذلك، يجب على الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد - 19 الحصول على اللقاح أيضا، إلا أنه لا يمكن تلقي اللقاح إلا ابتداء من 4 أسابيع بعد المرض.

أين وكيف يمكنني تلقي اللقاح؟

يتم إجراء التطعيم في أماكن مختلفة. سوف يتم إبلاغك في الوقت المناسب متى وأين يمكنك الحصول على اللقاح.

كيف تتم عملية التطعيم؟

يتم التطعيم بشكل طوعي. ولا يترتب عليك أن تدفع أي شيء مقابل التطعيم. ستتسلم قبل التطعيم استبيان ("ورقة معلومات") يترتب عليك تعبئته. وفي حال كانت لديك أية استفسارات حول التطعيم، فيمكنك مناقشتها مع الطبيب / الطبيبة قبل تلقي التطعيم. الرجاء إحضار بطاقة التأمين "e-Card" (في حال كانت متوفرة) وبطاقة التطعيم (في حال كانت متوفرة) إلى موعد التطعيم.

ستحصل عند التطعيم على حقنة في الذراع العلوية. تحتوي هذه الحقنة على مادة اللقاح. يجب عليك بعد تلقي اللقاح البقاء في مكان التطعيم لمدة 20 دقيقة. إن شعرت بعد التطعيم بأنك لست على ما يرام، فيرجى إبلاغ الطبيب أو الطبيبة بذلك. يوجد أنواع مختلفة من اللقاحات. يتم إعطاؤها على عدة جرعات. ويجب أن يتم ترك 21 يوماً على الأقل بين الجرعة الأولى والثانية. ومن المقرر الحصول على الجرعة المعززة ابتداءً من الشهر الرابع بعد جرعة التطعيم الثانية، إلا أنه يجب أن يتم ذلك بعد 6 أشهر كحد أقصى.

هل يمكنني اختيار مادة اللقاح؟

لا، سوف تحصل على مادة اللقاح المتوفرة حالياً. ولا نعرف أي مادة ستكون متوفرة.

هل يمكن أن يترتب على لقاح كوفيد – 19 أعراض جانبية؟

يمكن أن يتسبب اللقاح في أعراض جانبية. ويمكن لذلك أن يتمثل في حدوث آلام أو انتفاخات أو احمرار في مكان الحقن. ويشعر الناس بعد التطعيم في الكثير من الأحيان بأعراض كالتعب أو صداع في الرأس أو ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، كما يمكن حدوث غثيان أو تقيؤ أو شعور بالبرد الشديد. إلا أن هذه الأعراض هي رد فعل طبيعي على اللقاح. وبالتالي، فإن ذلك يحدث لأن الجسم يستعدّ لمقاومة مسببات المرض. وغالبا ما تختفي هذه الأعراض بعد بضعة أيام. ويتعرض من كل 10 أشخاص مُطعّمين أكثر من شخص إلى أعراض جانبية.

هل يجب أن أرتدي كمامة FFP2 رغم التطعيم؟

رغم التطعيم، يجب عليك الالتزام بإرشادات السلامة كاستخدام حماية لمنطقة الفم والأنف / كمامات FFP2، والالتزام بقواعد مسافات التباعد ولوائح النظافة.

المزيد من المعلومات:

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html>

<https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html>

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-Schutzimpfung.html>