

新型冠状病毒疫苗 接种基本信息

新型冠状病毒

新型冠状病毒（正式名称为：SARS-CoV-2，即“严重急性呼吸综合征冠状病毒2”）会在人与人之间传播，并引发新冠肺炎（COVID-19）。新型冠状病毒可能感染所有年龄段的人群。

病症可能持续多天，甚至好几个星期，症状主要表现为发烧、咳嗽、嗅觉和味觉丧失、呼吸困难等。严重情况下还可能引发呼吸道和其他器官炎症，导致患者必须在重症监护室接受治疗。新冠感染有可能产生长期后果，也可能致命。接种疫苗是预防新冠感染的最佳途径。

为什么应该接种新冠病毒疫苗？

疫苗接种可以保护您免受新冠肺炎重症的伤害。

新冠病毒疫苗是如何发挥作用的？

接种疫苗会刺激身体产生抗体。抗体会保护您在接触新冠病毒时免于患上新冠重症。疫苗针对新冠重症的保护期至少是6个月。接种疫苗后在，虽说在少数情况下仍可能感染病毒，但症状都相对较轻，可避免引起并发症和造成死亡。

疫苗成分不含新冠病毒，因而不会因接种新冠病毒疫苗而感染新冠肺炎。

新冠病毒疫苗接种是否安全？

是的，经测试证明：新冠病毒疫苗有效且安全。所有在欧洲批准使用的新冠病毒疫苗均经过广泛测试，并将继续受到严格监控。正是在此基础上，欧洲药品管理局（EMA）才批准这些新冠病毒疫苗上市。

哪些人可以接种新冠病毒疫苗？

年满5岁以上可接种疫苗。

有过往病史者（如糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等）也可以接种新冠病毒疫苗。请事先咨询您的主治医生，决定您是否要接种新冠病毒疫苗。

过敏者（如食物过敏、花粉或屋尘过敏、抗生素不耐受）也可以接种新冠病毒疫苗，因为疫苗不含这些过敏源成分。请在接种前告知医生您的过敏情况，并随身携带您的过敏证明。

哪些人群不应该接种新冠病毒疫苗？

如果您正患有急性严重感染，且高烧（体温超过38°C），请在接种疫苗前咨询您的主治医生。

孕妇或觉得自己可能怀孕或有备孕计划的女性，请咨询您的主治医生。

新冠肺炎确诊患者（在首次PCR测试呈阳性后至少4周）。



曾经感染过新冠病毒是否还应该接种疫苗？

既往新冠病毒感染者也可能被再次传染，也应该接种新冠病毒疫苗。
但疫苗接种要在病愈4周之后。

在哪里可以接种新冠病毒疫苗？

疫苗接种设有多个站点。接种站点的地址和开放时间会及时予以公布。

新冠病毒疫苗的接种流程？

疫苗接种是自愿的，且无需为疫苗接种支付任何费用。

在接种疫苗前，您将收到一份必须填写的表格（“基础信息表”）。若您对疫苗接种有任何疑问，可在接种前咨询医生。

前往接种疫苗时，请随身携带医保卡（e-Card）和疫苗接种证书（Impfpass）（如果之前没有疫苗接种证书，则不必携带）。

疫苗接种的注射位置是上臂。接种疫苗后，您必须在现场停留20分钟左右。如有任何不适，请告诉现场的医生。

目前接种的疫苗有不同类型，分多次接种。接种第1剂疫苗后至少间隔21天再接种第2剂疫苗。在接种第2剂疫苗后的第4个月起可打加强针，但最晚不超过6个月。

我可以选择疫苗吗？

不可以。您可以接种当时可用的疫苗，但我们并不知道当时可用的疫苗会是哪种。

接种新冠病毒疫苗会有不良反应吗？

疫苗接种后可能会产生一些不良反应，包括：注射部位的疼痛、肿胀或发红。此外常见疲倦、头痛或轻度发烧，以及恶心、呕吐或畏寒等症状。

这些不良反应是新冠病毒疫苗接种的正常反应，因为身体进入抵御病原体的备战状态。大多数情况下，不良反应几天后就会消失。每10个疫苗接种者中，会有1人以上出现不良反应。

接种新冠病毒疫苗后是否还需要佩戴FFP2防护口罩？

尽管接种了新冠病毒疫苗，但您仍须遵守佩戴口罩或FFP2防护口罩，并遵守保持距离及其他卫生防疫规定。

更多相关信息请参阅下列网站

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html>

<https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html>

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-Schutzimpfung.html>

