

كورونا فيروس ضد الوقائي التطعيم حول معلومات ورقة

ينتقل فيروس كورونا (سارس- كوف 2) من شخص إلى آخر مسببا مرض كوفيد - 19. ويصيب مرض كورونا جميع الناس بغض النظر عن أعمارهم. ويمكن لهذا المرض أن يستمر عدة أيام وصولا إلى عدة أسابيع، حيث يمكن أن تصاحبه أعراض كالحُمى والسعال وفقدان حاستي الشم والذوق وضيق التنفس. وفي حال تطوّر المرض بشكل حاد، يمكن حدوث التهابات في مجرى التنفس وأعضاء أخرى، مما يمكن أن يجعل العلاج في قسم العناية المركزة ضروريا. ويمكن أن يترتب على مرض كورونا عواقب على المدى البعيد، كما يمكن أن يكون قاتلا أيضا. والتطعيم هو الحماية الأفضل ضد مرض كورونا.

لماذا يجب عليك الحصول على التطعيم؟

التطعيم يحميك من الإصابة الخطيرة بمرض كوفيد - 19.

كيف يعمل اللقاح؟

يُحفّز اللقاح جسّدك على تطوير أجسام مضادة. وهذه الأجسام المضادة تحميك من الإصابة بشكل خطير إذا تعرضت لفيروسات كوفيد - 19 (سارس - كوف 2). ويوفر لك هذا اللقاح الحماية من الإصابة بالعدوى لمدة 6 شهور على الأقل. وإذا حدثت في حالات استثنائية إصابة بمرض كوفيد - 19 رغم تلقي اللقاح، فإن مسار المرض يكون خفيفا للغاية، مما يسمح بتجنب المضاعفات وحالات الوفاة.

لا تحتوي اللقاحات على فيروس (سارس - كوف 2). وبالتالي، فليس من الممكن أن تصاب بكوفيد - 19 بسبب اللقاح.

هل اللقاح آمن؟

نعم. لقد تم إجراء فحوصات والتأكد على أن اللقاحات فعالة وآمنة. وتم اختبار جميع لقاحات كوفيد - 19 المرخصة في أوروبا باستفاضة، التي لا تزال تخضع للرقابة الصارمة. لذلك، فقد قامت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بمنح الإذن بترخيص هذه اللقاحات.

من يمكنه تلقي اللقاح؟

يمكن إعطاء اللقاحات - حسب نوع اللقاح - للأشخاص ابتداء من سن 16 أو 18. ويمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة أيضا (كالسكري، وضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب، والربو). ويمكنهم دائما الحديث مع طبيبيهم المسؤول حول التطعيم بشكل مسبق واتخاذ قرار فيما إن كانوا يريدون تلقي اللقاح. ويمكن أيضا تطعيم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية (مثل الحساسية الغذائية أو الحساسية من حبوب اللقاح أو غبار المنزل أو عدم تحمل المضادات الحيوية) لأن اللقاح لا يحتوي على هذه المواد. يرجى إبلاغ الطبيب عن الحساسية الموجودة لديك خلال الاستشارة التوضيحية وإحضار البطاقة الخاصة بالحساسية معك.

من لا يمكنه تلقي اللقاح؟

إن كنت تعاني من عدوى شديدة وحادة مع ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية)، يرجى الحديث مع الطبيب المسؤول قبل تلقي اللقاح. إن كنتِ حاملٍ أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، يرجى الحديث مع طبيبك المسؤول. إن كنت في الوقت الحالي مصابا بكوفيد - 19 (حتى 4 أسابيع بعد أول فحص PCR إيجابي (فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل)).

هل يترتب على الأشخاص الذي أصيبوا في وقت مسبق بكوفيد - 19 تلقي اللقاح؟

يمكنك التعرض إلى العدوى بعد الإصابة بكوفيد - 19 مجددا. لذلك، يجب أيضا على الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد - 19 الحصول على اللقاح، إلا أنه لا يمكن إعطاء اللقاح إلا بعد 6 أشهر من الإصابة.

أين وكيف يمكنني تلقي اللقاح؟
يتم إجراء التطعيم في أماكن مختلفة. سوف يتم إبلاغك متى وأين يمكنك الحصول على اللقاح في الوقت المناسب.

كيف تتم عملية التطعيم؟

تتم عملية التطعيم بشكل طوعي. ولا يترتب عليك أن تدفع أي شيء مقابل التطعيم. قبل التطعيم، سوف تحصل على استبيان ("ورقة معلومات") يترتب عليك تعبئته. وفي حال كانت لديك أية استفسارات حول التطعيم، فيمكنك مناقشتها مع الطبيب قبل تلقي التطعيم. يرجى إحضار بطاقة التأمين (e-Card) وبطاقة التطعيم (إن كانت متوفرة لديك) عند موعد التطعيم. عند التطعيم، ستحصل على حقنة في الذراع العلوية. تحتوي هذه الحقنة على مادة اللقاح. وبعد التطعيم، يجب عليك البقاء في المكان لمدة 20 دقيقة. إن لم تشعر بعد التطعيم بأنتك على ما يرام، فيرجى إبلاغ الطبيب بذلك. يوجد أنواع مختلفة من اللقاحات. حسب نوع اللقاح، يمكنك تلقي إلى حد جرعتين. ويتم إعطاء الجرعة الثانية بعد بضعة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

هل يمكنني اختيار مادة اللقاح؟

لا، يمكنك الحصول على اللقاح المتوفر في الوقت الحالي. ولا يمكننا حتى الآن أن نعرف أيًا سيكون.

هل يمكن أن يترتب على لقاح كوفيد – 19 أعراض جانبية؟

يمكن للقاح أن يتسبب في أعراض جانبية غير مريحة. ويمكن لذلك أن يتمثل في آلام أو ورم أو احمرار في مكان الحقن. وكثيرا ما يشعر الناس بعد التطعيم بالتعب أو صداع في الرأس مثلا أو ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، كما يمكن حدوث غثيان أو تقيؤ أو الشعور بالبرد بشدة. إلا أن هذه الأعراض تمثل رد فعل طبيعي على اللقاح. وبالتالي، فإن ذلك يحدث لأن الجسم يستعد لمقاومة مسببات المرض. وغالبا ما تختفي هذه الأعراض بعد بضعة أيام. ومن كل 10 أشخاص مُطعمين يتعرض أكثر من شخص إلى أعراض جانبية.

هل يجب أن أرتدي كمامة FFP2 رغم التطعيم؟

رغم التطعيم، يجب عليك الالتزام بإرشادات السلامة كاستخدام حماية لمنطقة الفم والأنف / كمامات FFP2، والالتزام بقواعد مسافات التباعد ولوائح النظافة.

روابط للمزيد من المعلومات:

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html>

<https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html>

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-Schutzimpfung.html>