

## Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder

### Kostenfreie Impfungen

Alter/ Impfung	7. Lebens- woche	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7.– 10. Monat	11. Monat	12. Monat	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17.– 19. Monat	20.– 24. Monat	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr
Rotavirus (RV) <sup>1</sup>	1. Impfung	2. Impfung, frühestens 4 Wochen nach der 1. Impfung	3. Impfung abhängig vom verwendeten Impfstoff frühestens 4 Wochen nach der 2. Impfung															
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus Influenzae B (HIB) Hepatitis B (HBV)		1. Impfung: 6-fach		2. Impfung: 6-fach, 2 Monate nach der 1. Impfung			3. Impfung: 6-fach, frühestens 6 Monate nach der 2. Impfung											
Pneumokokken (PNC) <sup>2</sup>		1. Impfung		2. Impfung, 2 Monate nach der 1. Impfung				3. Impfung: frühestens 6 Monate nach der 2. Impfung										
Mumps Masern Röteln (MMR)							Bei 1. Impfung im 9. – 12. Monat: 2. Impfung nach 3 Monaten		Impfung nachholen, vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen									
							Bei 1. Impfung nach dem 12. Monat: 2. Impfung frühestens 4 Wochen nach der 1. Impfung“											

1) RV: bis zur vollendeten 24. Lebenswoche (Rotarix, 2 Dosen) beziehungsweise vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)

2) PNC: kostenlos bis zum 2. Geburtstag, für Kinder mit besonderem Risiko bis zum 5. Geburtstag

## Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder

### Nicht kostenfreie Impfungen

Alter/ Impfung	7. Lebens- woche	3. Monat	4.– 5. Monat	6. Monat	7.– 9. Monat	10.– 11. Monat	12. Monat	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17.– 19. Monat	20.– 24. Monat	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr
Meningokokken B <sup>1</sup>		1. Impfung	2. und 3. Impfung Abstand mindestens 1 Monat		Nachhol-Impfung			Auffrischungs- beziehungsweise Nachhol-Impfung									
Meningokokken C <sup>2</sup>								1 Impfung ab dem 13. Monat									
FSME								1. Impfung	2. Impfung				3. Impfung				Auf- frischungs- Impfung
Varizellen (VZV)								Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mindestens 6 Wochen									
Hepatitis A (HAV)								Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mindestens 6 Monate									
Influenza (IV) <sup>3</sup>					jährliche Impfung												

1) Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff

2) Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff

3) Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr oder wenn das Kind bisher erst eine einzige Impfung erhalten hat, 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen; danach 1 jährliche Impfung ausreichend