

## Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder

### Kostenfreie Impfungen

Alter/ Impfung	7. Lebens- woche	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. – 9. Monat	10. – 11. Monat	12. Monat	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. – 19. Monat	20. – 24. Monat	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr
Rotavirus (RV) <sup>1</sup>	1. Impfung	2. Impfung, frühestens 4 Wochen nach der 1. Impfung	3. Impfung abhängig vom verwendeten Impfstoff frühestens 4 Wochen nach der 2. Impfung															
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus Influenzae B (HIB) Hepatitis B (HBV)		1. Impfung: 6-fach		2. Impfung: 6-fach, 2 Monate nach der 1. Impfung				3. Impfung: 6-fach, frühestens 6 Monate nach der 2. Impfung										
Pneumokokken (PNC) <sup>2</sup>		1. Impfung		2. Impfung, 2 Monate nach der 1. Impfung				3. Impfung: frühestens 6 Monate nach der 2. Impfung										
Mumps Masern Röteln (MMR)							Bei 1. Impfung im 10. – 12. Monat: 2. Impfung nach 3 Monaten					Impfung nachholen, vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen						
							Bei 1. Impfung nach dem 12. Monat: 2. Impfung frühestens 4 Wochen nach der 1. Impfung											

1) RV: bis zur vollendeten 24. Lebenswoche (Rotarix, 2 Dosen) beziehungsweise vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)

2) PNC: kostenlos bis zum 2. Geburtstag, für Kinder mit besonderem Risiko bis zum 5. Geburtstag

## Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder

### Nicht kostenfreie Impfungen

Alter/ Impfung	7. Lebens- woche	3. Monat	4. – 5. Monat	6. Monat	7. – 9. Monat	10. – 11. Monat	12. Monat	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. – 19. Monat	20. – 24. Monat	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	
Meningokokken B <sup>3</sup>		1. Impfung	2. und 3. Impfung Abstand mindestens 1 Monat		Nachhol-Impfung			Auffrischungs- beziehungsweise Nachhol-Impfung										
Meningokokken C <sup>4</sup>								1 Impfung ab dem 13. Monat										
FSME								1. Impfung	2. Impfung				3. Impfung					Auf- frischungs- Impfung
Varizellen (VZV)								Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mindestens 4 Wochen										
Hepatitis A (HAV)								Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mindestens 6 Monate										
Influenza (IV) <sup>5</sup>					jährliche Impfung													

3) Men-B: Bei späterem Impfbeginn berät Sie Ihre Impfärztin beziehungsweise Ihr Impfarzt über die Details.

4) MEC-C: Bei früherem Impfbeginn berät Sie Ihre Impfärztin beziehungsweise Ihr Impfarzt über die Details.

5) IV: Bei Kindern werden bei Erstimmunisierung bis zum vollendeten 8. beziehungsweise 9. Lebensjahr (tetravalenter Totimpfstoff) 2 Impfungen mit mindestens 4 Wochen Abstand empfohlen.