



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ
ВІД ГЕПАТИТУ В
вакциною Engerix-B 10 мкг/0,5 мл**

Шановні батьки, шановні піклувальники!

Гепатит В – це запалення печінки, спричинене висококонтагіозним вірусом гепатиту В, що передається через кров та інші біологічні рідини (слина, сперма), які містять вірус. «Воротами інфекції» зазвичай є невеликі пошкодження шкіри або слизової оболонки. Інфікування також може відбуватися через предмети (зубні щітки, леза для гоління, голки для ін'єкцій, голки для акупунктури, інструменти для татуювання), які контактували з інфекційною рідиною. Гепатит В – це захворювання з широким спектром перебігу. У більшості випадків хвороба перебігає безсимптомно. Перші ознаки хвороби зазвичай нехарактерні: втома, втрата апетиту та нудота. При гострому перебігу хвороби з'являються такі симптоми, як блювання, жовтяниця, освітлення калу, потемніння сечі, свербіж, швидкоплинний висип, біль у суглобах, чутлива до тиску, збільшена печінка та гарячка. В Європі від 0,5 до 1 % гострих інфекцій закінчуються летально. 10 % хворих (від 30 до 90 % серед немовлят і дітей молодшого віку) залишаються носіями вірусу на все життя, що рівнозначно хронічному перебігу хвороби. Наслідками хронічного запалення печінки є або цироз печінки, або пухлини печінки.

Гепатит В є однією з найбільших проблем охорони здоров'я у світі. Близько двох мільярдів осіб перехворіли на гепатит В, а близько 350 мільйонів мають хронічну інфекцію вірусу гепатиту В. Оскільки досі не існує ніякого надійно ефективного методу лікування інфекції або її хронічної форми, щеплення є єдиним захистом. Щеплення проти гепатиту В рекомендується всім дітям у віці від 3 місяців. Також можливо зробити щеплення і пізніше. Всім дітям слід зробити щеплення від гепатиту В до тринадцятирічного віку. Існує особливо нагальна рекомендація щодо вакцинації для груп ризику з підвищеним ризиком зараження інфекцією, таких як медичний персонал.

Первинна імунізація складається з 2 щеплень з інтервалом щонайменше 4 тижні та третього щеплення через 6-12 місяців після першого щеплення. Якщо первинна імунізація була проведена у грудному або ранньому дитячому віці, то у віці від 7 до 13 років рекомендується ревакцинація. Для осіб, які отримали щеплення вакциною проти гепатиту В не в грудному чи молодшому дитячому віці, а пізніше і які не належать до груп ризику, ревакцинація не передбачається, згідно з існуючими на сьогодні даними. Індивідуальну тривалість захисту можна визначити за допомогою аналізу крові (визначення антитіл).

Вакцина

Вакцина містить очищений основний поверхневий антиген вірусу гепатиту В і викликає активну імунізацію, тобто стимулює організм до вироблення антитіл. Вакцина проти гепатиту В для дітей та підлітків віком до 15 років, яка наразі використовується, – Engerix-B 10 мкг/0,5 мл.

Будь ласка, див. на звороті, дякуємо!

Побічні дії

Як і всі ліки, щеплення можуть мати небажані побічні дії. До цього інформаційного листка додається інструкція про застосування вакцини, в якій міститься інформація про склад, можливі протипоказання та побічні дії. Про всі реакції та побічні дії, особливо ті, які не зазначені в цій інструкції про застосування, негайно повідомляйте свого лікаря.

Проведення щеплення

Щеплення може зробити шкільний лікар служби охорони здоров'я лише за згодою батьків або піклувальників. Однак згода не означає, що Ваша дитина отримає щеплення в будь-якому випадку. Рішення приймається лікарем з огляду на надану Вами інформацію. Якщо Ваша дитина хворіла або отримала інші щеплення в період між заповненням заяви про згоду та фактичною датою проведення щеплення, будь ласка, повідомте про це лікаря або класного керівника до дати проведення щеплення. Школа своєчасно повідомить Вас про дату проведення щеплення.

БУДЬ ЛАСКА, НЕХАЙ ВАША ДИТИНА ВІЗЬМЕ З СОБОЮ ВСІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЩЕПЛЕННЯ.

(довідка про стан здоров'я, сертифікат щеплень, карта щеплень)

Це дозволить лікарю визначити, які щеплення потрібні Вашій дитині.

ДЯКУЄМО!