



**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКЕ
ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА, КОКЛЮША И ПОЛИОМИЕЛИТА
вакциной Repevax®**

Уважаемые родители и лица, их заменяющие!

В своих последних рекомендациях по вакцинации Высший совет по вопросам здравоохранения еще раз подчеркнул важность прививок против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Каждому человеку следует сделать прививку от этих четырех заболеваний. Поскольку с годами защита от отдельных болезней ослабляется, после первичной иммунизации в младенчестве и раннем детстве защиту следует продлевать в школьные годы, а затем каждые 5 лет.

Дифтерия – это высококонтагиозное, иногда опасное для жизни заболевание, вызываемое бактерией и ее токсинами. В большинстве случаев оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем: во время разговора, при чихании или кашле. Самой распространенной формой является дифтерия ротоглотки, при которой на миндалинах появляется серо-белый налет. В результате могут возникнуть серьезные осложнения, в том числе необратимые поражения нервов, сердечной мышцы и почек; также возможен летальный исход. В Австрии эта болезнь уже почти не встречается, но в любой момент может быть занесена вновь, так как она все еще случается в странах с низким уровнем вакцинопрофилактики населения.

Столбняк – острое заболевание которое вызывает яд (= токсин) столбнячной палочки; характеризуется поражением нервной системы. Возбудители столбняка встречаются по всему миру: в пыли и грязи, в почве, в фекалиях лошадей, овец и коров. "Входными воротами" для возбудителей столбняка являются все виды травм и ран. Заболевание приводит к ригидности мышц и судорожной спазматической ригидности всего тела. Судороги дыхательных мышц являются опасными для жизни. Несмотря на современные возможности лечения, от 20 до 30 % больных столбняком умирают.

Коклюшем (Pertussis) можно заболеть в любом возрасте. Однако особенно опасным это заболевание является для младенцев и характеризуется сильными приступами кашля. У детей старшего возраста и взрослых коклюш часто принимает форму продолжительного кашля без типичных приступов кашля, причем у пожилых людей наблюдаются ночные приступы кашля. Осложнениями могут быть воспаление среднего уха, бронхит и воспаление легких, у младенцев коклюш может привести к летальному исходу. Возбудитель передается воздушно-капельным путем. Поскольку защита от болезни после прививки длится всего несколько лет, так же как и защита после перенесенного заболевания, необходимо регулярно продлевать защиту путем вакцинации. Это также необходимо для защиты от инфекции невакцинированных или не полностью вакцинированных младенцев и незащищенных пожилых людей.

Пожалуйста, см. на обороте, спасибо!

Детский паралич (полиомиелит) – это острое, лихорадочное вирусное заболевание, которое может привести к постоянному параличу. Передача происходит в основном через загрязнение и контактную инфекцию. Благодаря вакцинации эта болезнь больше не встречается в Австрии. Однако она все еще встречается в некоторых странах Африки и Азии, где население плохо иммунизировано, и может быть занесена в любое время. В случае занесения болезни невакцинированные люди могут заразиться ею.

Вакцина содержит детоксицированные бактериальные токсины возбудителя столбняка, дифтерии и коклюша или части возбудителя коклюша, а также инаktivированные вирусы полиомиелита. После прививки в организме человека вырабатываются защитные вещества (так называемые антитела), которые предотвращают возникновение заболевания в случае инфицирования (заражения).

Побочные действия

Как и все лекарства, прививки могут иметь нежелательные побочные действия. К данному информационному листку прилагается инструкция по применению вакцины, в которой содержится информация о составе, возможных противопоказаниях и побочных действиях. Обо всех реакциях и побочных действиях, особенно тех, которые не указаны в этой инструкции по применению, немедленно сообщайте своему врачу.

ПОЖАЛУЙСТА, ПУСТЬ ВАШ РЕБЕНОК ВОЗЬМЕТ С СОБОЙ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРИВИВКАХ.

(справка о состоянии здоровья, сертификат прививок, карта прививок)

Это позволит врачу определить, какая прививка нужна Вашему ребенку.

СПАСИБО!