



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ
ПРОТИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ ТА ПОЛІОМІЄЛІТУ
вакциною Repevax®**

Шановні батьки, шановні піклувальники!

У своїх останніх рекомендаціях щодо вакцинації Вища рада з питань охорони здоров'я ще раз підкреслила важливість щеплень проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту. Кожній людині слід мати щеплення проти цих чотирьох захворювань. Оскільки з роками захист від окремих хвороб послаблюється, після первинної імунізації в грудному та дитячому віці захист слід продовжувати в роки навчання в школі, а потім – кожні 5 років.

Дифтерія – це висококонтагіозне, іноді небезпечне для життя захворювання, спричинене бактерією та її отруйними речовинами (= токсинами). У більшості випадків вона передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом: під час розмови, при чханні або кашлі. Найпоширенішою формою є дифтерія ротоглотки, при якій на мигдаликах з'являється сіро-біле нашарування. В результаті можуть виникнути серйозні ускладнення, в тому числі незворотні ураження нервів, серцевого м'яза та нирок; також можливий летальний кінець. Ця хвороба вже майже не зустрічається в Австрії, але вона може повернутися в будь-який час, оскільки все ще трапляється в країнах з низьким рівнем вакцинопрофілактики населення.

Правець – це гостра хвороба, яку спричинює отрута (= токсин) правцевої палички; характеризується ураженням нервової системи. Збудники правця зустрічаються по всьому світу: в ґрунті, в ґрунті, у фекаліях коней, овець і корів. «Вхідними воротами» для збудників правця є всі види травм і ран. Захворювання призводить до ригідності м'язів і судомної ригідності всього тіла, схожій на спазм. Судоми дихальних м'язів є небезпечними для життя. Незважаючи на сучасні можливості лікування, від 20 до 30 % хворих на правець помирають.

На **кашлюк (коклюш)** можна захворіти в будь-якому віці. Однак особливо небезпечним це захворювання є для немовлят і характеризується сильними нападами кашлю. У дітей старшого віку та дорослих кашлюк часто протікає у формі тривалого кашлю без типових нападів кашлю; лише у літніх людей знову спостерігаються нічні напади кашлю. Серед ускладнень можуть спостерігатися запалення середнього вуха, бронхіт і запалення легень, у немовлят також може настати летальний кінець. Збудник передається повітряно-крапельним шляхом. Оскільки захист від хвороби після щеплення триває лише кілька років, так само як і після перенесеного захворювання, потрібно регулярно робити ревакцинацію, щоб продовжити захист. Це також необхідно для того, щоб захистити від інфекції невакцинованих або неповністю вакцинованих немовлят та незахищених людей похилого віку.

Будь ласка, див. на звороті, дякуємо!

Дитячий параліч (поліомієліт) – це гостре, гарячкове вірусне захворювання, що може призвести до постійного паралічу. Передача відбувається переважно через забруднення та контактну інфекцію. Завдяки вакцинації ця хвороба більше не зустрічається в Австрії. Однак вона все ще трапляється в деяких країнах Африки та Азії, де населення погано імунізоване, і може бути занесена в будь-який час. У разі занесення хвороби невакциновані особи можуть захворіти на неї.

Вакцина містить детоксиковані бактеріальні токсини збудника правця, дифтерії та кашлюку або частини збудника кашлюку, а також інактивовані віруси поліомієліту. Після щеплення в організмі людини виробляються захисні речовини (так звані антитіла), які запобігають виникненню захворювання у разі інфікування (зараження).

Побічні дії

Як і всі ліки, щеплення можуть мати небажані побічні дії. До цього інформаційного листка додається інструкція про застосування вакцини, в якій міститься інформація про склад, можливі протипоказання та побічні дії. Про всі реакції та побічні дії, особливо ті, які не зазначені в цій інструкції про застосування, негайно повідомляйте свого лікаря.

БУДЬ ЛАСКА, НЕХАЙ ВАША ДИТИНА ВІЗЬМЕ З СОБОЮ ВСІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЩЕПЛЕННЯ.

(довідка про стан здоров'я, сертифікат щеплень, карта щеплень)

Це дозволить лікарю визначити, які щеплення потрібні Вашій дитині.

ДЯКУЄМО!