

معلومات عن التّطعيم الوقائي
ضدّ الخُناق والكزاز والسّعال الديكي وشلل الأطفال
بلفاح ريبيفاكس®

أولياء الأمور الأعزّاء!

في توصياته الحاليّة للتّطعيم، أشارت اللّجنة الوطنيّة للتّطعيم مرّة أخرى إلى أهميّة التّطعيمات ضدّ الخُناق والكزاز والسّعال الديكي وشلل الأطفال. يجب أن يتمّع الجميع بالحماية ضدّ هذه الأمراض الأربعة من خلال التّطعيم. بما أنّ المناعة ضدّ الأمراض المختلفة تضعف مع مرور السّنوات، فإنّه بعد التّطعيم الأساسي في سنّ الرّضاعة والطّفولة المبكّرة، ينبغي تمديد الحماية خلال فترة الدّراسة ولاحقاً كلّ خمس سنوات.

الخُناق هو مرض شديد العدوى، وأحياناً يهدّد الحياة بسبب البكتيريا وسمومها (= دَيْفَان). يحدث الانتقال من شخص لآخر في معظم الحالات من خلال عدوى الفُطَيّرات - عن طريق التّحدث أو العطس أو السّعال. الأكثر شيوعاً هو الخُناق البلعومي، حيث تظهر الطّبقات البيضاء القذرة على اللّوزتين. قد يؤدّي ذلك إلى مضاعفات خطيرة وأضرار دائمة تصيب الأعصاب وعضلة القلب والكلّى، كما قد يؤدّي أحياناً إلى الوفاة. وفي الثّمسا نادراً ما تُلاحظ الإصابة بهذا المرض، إلّا أنّه يمكن أن يُعاد إدخاله في أيّ وقت، لأنّه ما زال منتشرّاً في بلدان يكون فيها مستوى التّطعيم بين السكّان منخفضاً.

الكزاز (مرض تشنّج العضلات) هو مرض خطير في الجهاز العصبي يسببه السّم (= دَيْفَان) من بكتيريا الكزاز. تمّ العثور على مسببات مرض الكزاز في جميع أنحاء العالم - في الغبار والأوساخ، وفي التّربة، وفي براز الخيول والأغنام والأبقار. نقطة دخول مسببات مرض الكزاز هي جميع أنواع الإصابات والجروح. هذا المرض يؤدّي إلى تصلّب العضلات ويأتي على شكل نوبات تشنّج في كامل الجسم. التشنّجات في عضلات الجهاز التنفّسي تهدّد الحياة. على الرّغم من إمكانيّات العلاج المتوفّرة في الوقت الحاليّ، يموت ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من المصابين بالكزاز.

الإصابة **بالسّعال الديكي** (الشّاهوق) تحدث في أيّ عمر. ومع ذلك، فإنّ المرض خطير بشكل خاص في سنّ الرّضاعة ويتميّز بنوبات السّعال الشّديدة. لدى الأطفال الأكبر سنّاً والبالغين، غالباً ما يتطوّر السّعال الديكي فقط كسعال طويل الأمد دون نوبات السّعال الاعتياديّة، ولا تحدث نوبات السّعال اللّيلي مرّة أخرى إلّا عند كبار السّن.

يمكن أن تشتمل المضاعفات على التهاب الأذن الوسطى والتهاب القصبات والالتهاب الرّئوي، عند الرّضع، قد يكون السّعال الديكي مميتاً أيضاً. تحدث العدوى كعدوى الفُطَيّرات. نظراً لأنّ حماية التّطعيم، ولكن أيضاً الحماية بعد مرور المرض، تستمرّ بضع سنوات فقط، ينبغي تمديد الحماية بانتظام عن طريق التّطعيم. هذا يضمن أيضاً حماية للرّضع غير الملقّحين أو الذين لم يتمّ تطعيمهم تطعماً كاملاً بعد ولكبار السّن غير المحمّيين من العدوى.

أقلب الصّفحة من فضلك - شكراً لك!

شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) هو مرض فيروسي حموي شديد يمكن أن يسبب الشلل. يحدث انتقال العدوى بشكل رئيسي من خلال الأوساخ وعدوى اللطاخة. في النمسا، لم يعد المرض يظهر بفضل التطعيم. ومع ذلك، فإنه لا يزال يحدث في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية ذات حماية تطعيم منخفضة للسكان ويمكن استقدامه في أي وقت. في حالة تسلسل المرض، يمكن أن يصاب الأشخاص غير الملقحين به.

يحتوي اللقاح على سموم بكتيرية مُخَلَّصة من السموم من مسببات مرض الخناق والكزاز والسعال الديكي أو أجزاء من مسببات مرض الشاهوق بالإضافة إلى فيروسات التهاب سنجابية النخاع المقتولة. بعد التطعيم، يُنتج جسم الإنسان أجساماً مضادة (ما يسمى بالأجسام المضادة) وهذه تمنع ظهور المرض في حالة الإصابة (العدوى).

الآثار الجانبية

يمكن أن تسبب اللقاحات آثاراً جانبية غير مرغوب فيها، كما هو الحال عند تناول الأدوية الأخرى. صحيفة المعلومات هذه مرفقة بنشرة تعليمات لاستخدام التطعيم، والتي تخبرك بالتركيبة وموانع الاستعمال المحتملة والآثار الجانبية. يرجى إبلاغ طبيبك/طبيبك على الفور بجميع التفاعلات والآثار الجانبية، وخاصة تلك غير المدرجة في صحيفة المعلومات هذه.

يرجى تزويد طفلك بجميع سجلات التطعيم.

(البطاقة الصحية، دفتر التطعيم، بطاقة التطعيم)

هذا الأمر يسمح للطبيب/للطبيبة بتحديد التطعيم الذي يحتاجه طفلك.

شكراً جزيلاً!