

معلومات عن التّطعيم الوقائي
ضدّ التهاب الكبد فئة ب
بلقاح إنجيريكس-بي ١٠ ميكروغرام/ ٠.٥ مل

أولياء الأمور الأعزّاء!

التهاب الكبد فئة ب هو التهاب يصيب الكبد يسبّبه فيروس التهاب الكبد فئة ب شديد العدوى ويتمّ نقله عبر الدّم الذي يحتوي على الفيروس وسوائل الجسم الأخرى (اللعاب، السائل المنوي). عادة ما تكون نقاط الدخول عبارة عن إصابات صغيرة في الجلد أو الغشاء المخاطي. يمكن أن تحدث العدوى أيضاً من خلال الأشياء (فرشاة الأسنان، شفرات الحلاقة، إبر الحقن، إبر الوخز بالإبر، أدوات الوشم) التي تداخلت ولمست السوائل المعدية. التهاب الكبد فئة ب هو مرض ذو مسارات مختلفة. في نسبة كبيرة من الحالات، يكون المرض بدون أعراض. عادة ما تكون العلامات الأولى للمرض غير معهودة، مثل التعب وفقدان الشهية والغثيان. يظهر المرض الحاد مع أعراض مثل القيء والبراز فاتح اللون والبول الداكن والحكة والطّفح الجلدي العابر وآلم في المفاصل وشعور بضغط حسّاس وتضخّم في الكبد والحمى. في أوروبا، يكون سير ٠.٥ إلى ١٪ من الإصابات الحادة بشكل قاتل. ١٠٪ من المرضى (٣٠ إلى ٩٠٪ من الأطفال الصّغار والرّضع) يبقون حاملين للفيروس مدى الحياة، وهو بمثابة مسار مزمن للمرض. عواقب التهاب الكبد المزمن هي إما تشمّع أو أورام الكبد.

التهاب الكبد فئة ب هو واحد من المشاكل الصحيّة الرّئيسيّة في العالم. وعلى هذا فإنّ ملياري شخص أصيبوا بعدوى التهاب الكبد فئة ب وحوالي ٣٥٠ مليون شخص مصابون إصابة مزمنة بفيروس التهاب الكبد فئة ب. وبما أنّه لا توجد حتى الآن طريقة علاج حقيقيّة أو أمانة وفعّالة ضدّ العدوى أو الشّكل المزمن للمرض، فإنّ التّطعيم هو الحماية الوحيدة. يوصى بالتّطعيم ضدّ التهاب الكبد فئة ب لجميع الأطفال ابتداءً من سن ٣ أشهر. يمكن إجراء التّطعيم أيضاً في وقت لاحق. يجب تطعيم جميع الأطفال ضدّ التهاب الكبد فئة ب إلى سن ١٣ عاماً على أبعد تقدير. بالنسبة للمجموعات المعرّضة للخطر والتي لديها خطر متزايد للإصابة بالعدوى، مثل الطّاقم الطّبي، هناك توصية تطعيم عاجلة بشكل خاص.

يتكوّن التّحصين الأساسي من ٢ من التّطعيمات بفواصل زمني لا يقلّ عن ٤ أسابيع وتطعيم ٣ بعد ٦ إلى ١٢ شهراً من التّطعيم الأول. بعد التّحصين الأساسي في عمر الرّضاعة أو المرحلة المبكّرة من الطّفولة يوصى بالتّطعيم المعزّز في سن ٧ إلى ١٣ عاماً. في حالة الأشخاص الذين يحصلون على التّحصين الأساسي في وقت لاحق بعد عمر الرّضاعة أو المرحلة المبكّرة من الطّفولة عبر لقاح التهاب الكبد فئة ب والذين لا ينتمون إلى الفئات المعرّضة للخطر، لا يوجد مقرر للتّطعيم المعزّز وفقاً للحالة الرّاهنة للعلم. يمكن تحديد مدّة الحماية الفرديّة عن طريق أخذ عيّنة دم (تحديد الأجسام المضادة).

اللقاح

يحتوي اللّقاح على مستضدّ سطحيّ رئيسيّ منقّى لفيروس التهاب الكبد فئة ب ويسبّب التّحصين النّشط، ممّا يعني أنّ الجسم يُحفّز لإنتاج الأجسام المضادة. اللّقاح المستخدم حالياً ضدّ التهاب الكبد فئة ب للأطفال والبالغين حتّى سن ١٥ عاماً هو لقاح إنجيريكس-بي ١٠ ميكروغرام/ ٠.٥ مل.

أقلب الصّفحة من فضلك - شكراً لك!

الآثار الجانبية

يمكن أن تسبب اللقاحات آثاراً جانبية غير مرغوب فيها، كما هو الحال عند تناول الأدوية الأخرى. صحيفة المعلومات هذه مرفقة بنشرة تعليمات لاستخدام التطعيم، والتي تخبرك بالتركيبة وموانع الاستعمال المحتملة والآثار الجانبية. يرجى إبلاغ طبيبك/طبيبته على الفور بجميع التفاعلات والآثار الجانبية، وخاصة تلك غير المدرجة في صحيفة المعلومات هذه.

تنظيم عملية التطعيم

لا يمكن إجراء عملية التطعيم من قبل أطباء/طبيبات المدرسة التابعين لدائرة الخدمات الصحية (قسم البلدية ١٥) إلا في حال توفر إقرار الموافقة من قبل ولي الأمر. ومع ذلك، فإن الموافقة لا تعني أن طفلك سيحصل على التطعيم بشكل مؤكد. سيتم اتخاذ القرار من قبل الطبيب/الطبيبة مع مراعاة المعلومات التي قدمتها. إذا كان طفلك قد أصيب بمرض أو تلقى لقاحات أخرى في الفترة ما بين ملء إقرار الموافقة وموعد التطعيم الفعلي، فيرجى إبلاغ الطبيب/الطبيبة أو معلم/معلمة الصف قبل موعد التطعيم. سيتم إبلاغك بموعد التطعيم في الوقت المناسب من قبل المدرسة.

يرجى تزويد طفلك بجميع سجلات التطعيم.

(البطاقة الصحية، دفتر التطعيم، بطاقة التطعيم)

هذا الأمر يسمح للطبيب/الطبيبة بتحديد التطعيم الذي يحتاجه طفلك.

شكراً جزيلاً!