

**معلومات عن التطعيم الوقائي  
ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية  
بلقاح م-م-آر فاكس برو®**

أولياء الأمور الأعزاء!

في إطار خطة التطعيم التمساوية الحالية، أكدت اللجنة الوطنية للتطعيم مرة أخرى على أهمية الحماية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لجميع الأطفال. يتم تحقيق الحماية ضد العدوى عن طريق الحصول على التطعيم على مرتين ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. بحلول سن ١٣ عاماً على أبعد تقدير، يجب أن يكون جميع الأطفال قد تلقوا التطعيم الثاني ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. لذلك، يتم تقديم التطعيم المدمج ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية مجاناً في المدرسة في الصفين ١ و ٧ للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم مرتين ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

حتى إذا كان طفلك قد مر بالفعل بتجربة الإصابة بواحد أو اثنين من هذه الأمراض، فإنه يوصى بالتطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وهو ملائم بشكل جيد. فقط إذا تم تطعيم أكثر من ٩٠ ٪ من جميع الأطفال، يمكن ضمان اختفاء هذه الأمراض في المستقبل.

**الحصبة** مرض فيروسي شديد العدوى منتشر في جميع أنحاء العالم مصحوب بالحمى والسعال والتهاب الملتحمة والطفح الجلدي. المرضى المصابون بحالة شديدة بالحصبة يفرزون الفيروسات عند التحدث والسعال والعطس ("ما يسمى بعدوى القطرات"). نظراً لأن الحصبة شديدة العدوى، يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة داخل مجموعة غير محصنة (على سبيل المثال: داخل صفوف المدرسة). يمكن أن تشمل المضاعفات الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الأذن الوسطى أو التهاب القصبات أو الالتهاب الرئوي. في بعض الحالات، يمكن أن يحدث التهاب السحايا مع احتمال حدوث ضرر دائم. في حالات نادرة يظهر، بعد سنوات من الإصابة، مرض في الجهاز العصبي المركزي مع مسار خبيث ومميت بشكل خاص.

**الحصبة الألمانية** مرض معد حموي شديد العدوى مع طفح جلدي وتورم العقدة الليمفاوية الناجم عن فيروس الحصبة الألمانية ومنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. تحدث العدوى عن طريق عدوى القطرات. عدوى الحصبة الألمانية تكون خطيرة أثناء فترة الحمل. من الممكن أن يتسبب في أضرار شديدة للجنين مع تشوهات خلقية في الدماغ والعين والقلب. يمكن تجنب هذا الخطر من خلال التطعيم الوقائي.

**النكاف** مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق عدوى القطرات. يتميز بتورم مؤلم في الغدد اللعابية، وخاصة الغدة النكفية. في حالات قليلة، تؤثر أيضاً على غدد الجسم الأخرى مثل الخصيتين والمبيضين والبنكرياس. في حالة الإصابة بمرض النكاف بعد فترة المراهقة، يصاب حوالي واحد من كل ثلاثة مراهقين أو بالغين بالتهاب مؤلم في الخصية، والذي من الممكن أن يؤدي في حالات نادرة إلى العقم الدائم. حوالي ١٠ ٪ من المصابين بالمرض يصابون بالتهاب السحايا.

**اقلب الصفحة من فضلك - شكراً لك!**

### الآثار الجانبية

يمكن أن تسبب اللقاحات آثاراً جانبية غير مرغوب فيها، كما هو الحال عند تناول الأدوية الأخرى. صحيفة المعلومات هذه مرفقة بنشرة تعليمات لاستخدام التطعيم، والتي تخبرك بالتركيبة وموانع الاستعمال المحتملة والآثار الجانبية. يرجى إبلاغ طبيبك/طبيبتك على الفور بجميع التفاعلات والآثار الجانبية، وخاصة تلك غير المدرجة في صحيفة المعلومات هذه.

### تنظيم عملية التطعيم

لا يمكن إجراء عملية التطعيم من قبل أطباء/طبيبات المدرسة التابعين لدائرة الخدمات الصحية (قسم البلدية ١٥) إلا في حال توفّر إقرار الموافقة من قبل ولي الأمر. ومع ذلك، فإنّ الموافقة لا تعني أنّ طفلك سيحصل على التطعيم بشكل مؤكد. سيتمّ اتخاذ القرار من قبل الطبيب/الطبيبة مع مراعاة المعلومات التي قدّمها. إذا كان طفلك قد أصيب بمرض أو تلقى لقاحات أخرى في الفترة ما بين ملء إقرار الموافقة وموعد التطعيم الفعلي، فيرجى إبلاغ الطبيب/الطبيبة أو معلّم/معلّمة الصف قبل موعد التطعيم. سيتمّ إخبارك بموعد التطعيم من قبل المدرسة في الوقت المناسب.

يرجى تزويد طفلك بجميع سجلات التطعيم.

(البطاقة الصحية، دفتر التطعيم، بطاقة التطعيم)

هذا الأمر يسمح للطبيب/الطبيبة بتحديد التطعيم الذي يحتاجه طفلك.

شكراً جزيلاً!