

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРУ, ПАРОТИТУ та КРАСНУХИ
вакциною M-M-RvaxPro®**

Шановні батьки, шановні піклувальники!

У поточному австрійському графіку вакцинації Національний комітет з питань вакцинації ще раз підкреслив важливість захисту від кору, паротиту та краснухи для всіх дітей. Захист від інфекції забезпечується двома дозами щеплення від кору, паротиту та краснухи. Всім дітям слід отримати другу дозу щеплення від кору, паротиту та краснухи найпізніше у віці до 13 років. Тому в школі дітям першого та сьомого років навчання, які ще не отримали дві дози щеплення від кору, паротиту та краснухи, пропонується безкоштовне комбіноване щеплення від кору, паротиту та краснухи.

Навіть якщо Ваша дитина вже перехворіла на одне або два з цих захворювань, щеплення від кору, паротиту та краснухи є рекомендованим, воно добре переноситься. Тільки якщо більше 90% всіх дітей отримують щеплення, ці захворювання можна буде викоринити в майбутньому.

Кір – це інфекційна вірусна хвороба, яка широко поширена в усьому світі; вона характеризується високою температурою, кашлем, кон'юнктивітом і висипом на шкірі. Особи, які інфіковані кором та мають гострий перебіг хвороби, виділяють вірус під час розмови, при кашлі та чханні (так звана "крапельна інфекція"). Оскільки кір дуже заразний, він може дуже швидко поширюватися в групі невакцинованих (наприклад, у шкільному класі). До ускладнень належать бактеріальні інфекції, такі як запалення середнього вуха, бронхіт або запалення легень. У деяких випадках може виникнути менінгіт з можливими незворотними наслідками. Дуже рідко захворювання центральної нервової системи з особливо зловияким і смертельним перебігом виникає через роки після інфікування.

Краснуха – це висококонтагіозне, поширене в усьому світі інфекційне захворювання, яке супроводжується лихоманкою, висипом на шкірі та збільшенням лімфатичних вузлів. Збудником захворювання є вірус краснухи. Збудник передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження краснухою під час вагітності є небезпечним. Воно може спричинити серйозні ураження плоду з вродженими вадами розвитку мозку, очей і серця. Цьому ризику можна запобігти за допомогою профілактичного щеплення.

Паротит – це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Захворювання характеризується болючим набряком слинних залоз, особливо привушної слинної залози. У деяких випадках уражаються інші залози, такі як яєчка, яєчники та підшлункова залоза. У разі захворювання на паротит після статевого дозрівання приблизно у кожного третього юнака або дорослого чоловіка виникає болісне запалення яєчок, яке в рідкісних випадках може призвести до постійного безпліддя. Приблизно у 10 % хворих розвивається менінгіт.

Будь ласка, див. на звороті, дякуємо!

Побічні дії

Як і інші ліки, щеплення можуть мати небажані побічні дії. До цього інформаційного листка додається інструкція про застосування вакцини, в якій міститься інформація про склад, можливі протипоказання та побічні дії. Про всі реакції та побічні дії, особливо ті, які не зазначені в цій інструкції про застосування, негайно повідомляйте свого лікаря.

Проведення щеплення

Щеплення може зробити шкільний лікар служби охорони здоров'я лише за згодою батьків або піклувальників. Однак згода не означає, що Ваша дитина отримає щеплення в будь-якому випадку. Рішення приймає лікар з огляду на надану Вами інформацію. Якщо Ваша дитина хворіла або отримала інші щеплення в період між заповненням заяви про згоду та фактичною датою проведення щеплення, будь ласка, повідомте про це лікаря або класного керівника до дати проведення щеплення. Школа своєчасно повідомить Вас про дату проведення щеплення.

БУДЬ ЛАСКА, НЕХАЙ ВАША ДИТИНА ВІЗЬМЕ З СОБОЮ ВСІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЩЕПЛЕННЯ.

(довідка про стан здоров'я, сертифікат щеплень, карта щеплень)

Це дозволить лікарю визначити, які щеплення потрібні Вашій дитині.

ДЯКУЄМО!