

معلومات عن التطعيم الوقائي
ضدّ المكورات السّحائية A و C و W135 و Y
بلقاح نيمين ريكس®

أولياء الأمور الأعزّاء!

في إطار خطة التطعيم التّساويّة، يوصى بالتّطعيم ضدّ المكورات السّحائيّة لجميع اليافعين. يتمّ تقديم التّطعيم بلقاح متقارن مكوّن من ٤ مرّكّبات ضدّ مجموعات المكورات السّحائيّة A و C و W135 و Y مجاناً للأطفال في الصّفّ السّادس ضمن مشروع التّطعيم.

تظهر أمراض المكورات السّحائيّة في جميع أنحاء العالم، على أنّ وفرة المجموعات المختلفة للمكورات السّحائيّة المسبّبة للأمراض يختلف من منطقة إلى أخرى. في التّمسّا وكذلك في أوروبا، غالباً ما تكون المجموعات المصلّيّة B و C مسؤولة عن الأمراض، ولكنّ المجموعات المصلّيّة Y و W135 تظهر أيضاً أحياناً في حالات المرض. أصبحت المجموعة المصلّيّة Y أكثر شيوعاً بشكل ملحوظ في أمريكا الشماليّة والجنوبيّة، وكذلك في جنوب إفريقيا وجنوب آسيا. في المملكة العربيّة السّعوديّة، المجموعة المصلّيّة W135 هي السّائدة. في أفريقيا، تحدث معظم حالات المرض بسبب المجموعة المصلّيّة A. ويمكن ملاحظة ذلك أيضاً في الشّرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبيّة والدّول الّتي خلفها الاتّحاد السّوفيتي. خاصّة في القارة الأفريقيّة، فيما يسمّى بحزام التهاب السّحايا، تحدث أوبئة كبيرة مراراً وتكراراً. في البلدان الصّناعيّة، عادة ما تكون هناك حالات فرديّة فقط أو حالات تفشّي صغيرة.

تحدث أمراض المكورات السّحائيّة بسبب البكتيريا (النّيسريّة السّحائيّة، المكورات السّحائيّة). تصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سنّ ٥ سنوات واليافعين. في التّمسّا، تحدث حوالي ١٠٠ حالة إصابة بمرض المكورات السّحائيّة سنوياً، مع ملاحظة حالات حادّة لسير المرض أيضاً. ومع ذلك، يمكن للمكورات السّحائيّة أيضاً أن تستقرّ مؤقتاً لدى البشر في منطقة البلعوم الأنفي دون أن تؤدّي إلى المرض.

يحدث الانتقال من شخص لآخر عن طريق الإفرازات الصّادرة من منطقة البلعوم الأنفي. هذا يعني أنّ الأشخاص الّذين يحملون مسبّبات الأمراض هذه على الأغشية المخاطيّة في الأنف والحلق يمكن أن يصابوا أشخاصاً آخرين، على سبيل المثال عن طريق السّعال والعطس والتّقبيل.

على الأرجح، يحدث انتقال العدوى في الأماكن الّتي يكون فيها الأشخاص قريبين جدّاً من بعضهم البعض. يمكن أن تسبّب المكورات السّحائيّة أمراضاً تهدّد الحياة مثل التهاب أغشية الدّماغ (التهاب السّحايا) وتسمّم الدّم. بعد ٢ إلى ١٠ أيّام من الإصابة، قد تحدث أعراض مثل الحمّى المتزايدة بسرعة، والرّجفان، والقيء، والصّداع، وتصلّب الرّقبة، وآلام المفاصل والعضلات، والتّشنّجات، ورهاب الضّوء، والدّوار بشكل فردي أو معاً. عادة ما تظهر بقع حمراء على شكل نقط على الجلد. اقلب الصّفحة من فضلك - شكراً لك!

لدى الرضع والأطفال الصغار، عادة ما تكون الأعراض أقل تميزاً: الحمى، وفقدان الشهية أو القيء، والصراخ الشديد أو الأنين، والخوف، وحساسية للمس، وتصلب الرقبة، وملامح وجه متصلبة. في معظم الحالات، تحدث بقع الجلد الاعتيادية أيضاً عند الأطفال الصغار.

يمكن أن يخلف المرض ضرراً عصبياً دائماً. في الحالات الشديدة لسير المرض، خاصة إذا بدأ العلاج في وقت متأخر، يمكن أن يؤدي مرض المكورات السحائية أيضاً إلى الوفاة.

اللقاح هو لقاح متقارن مكون من ٤ مركبات ضد مجموعات المكورات السحائية، التي تحتوي على المكونات السطحية للمكورات السحائية من المجموعات المصلية A و C و W135 و Y. بعد التطعيم، يُنتج جسم الإنسان أجساماً مضادة (ما يسمى بالأجسام المضادة) وهذه تمنع حدوث المرض في حالة الإصابة (العدوى) بمسببات الأمراض هذه. اللقاح لا يحمي من الأمراض التي تسببها المكورات السحائية للمجموعة B. اللقاح المتقارن والمكون من ٤ مركبات ضد المكورات السحائية هو لقاح **نيمين ريكس®**.

الآثار الجانبية

يمكن أن تسبب التطعيمات آثاراً جانبية غير مرغوب فيها، كما هو الحال عند تناول الأدوية الأخرى. صحيفة المعلومات هذه مرفقة بنشرة تعليمات لاستخدام التطعيم، والتي تخبرك بتركيبته وموانع الاستعمال المحتملة والآثار الجانبية. يرجى إبلاغ طبيبك/طبيبتك على الفور بجميع التفاعلات والآثار الجانبية، وخاصة تلك غير المدرجة في صحيفة المعلومات هذه.

تنظيم عملية التطعيم

لا يمكن إجراء عملية التطعيم من قبل أطباء/طبيبات المدرسة التابعين لدائرة الخدمات الصحية (قسم البلدية ١٥) إلا في حال توفر إقرار الموافقة من قبل ولي الأمر. ومع ذلك، فإن الموافقة لا تعني أن طفلك سيحصل على التطعيم بشكل مؤكد. سيتم اتخاذ القرار من قبل الطبيب/الطبيبة مع مراعاة المعلومات التي قدمتها. إذا كان طفلك قد أصيب بمرض أو تلقى لقاحات أخرى في الفترة ما بين ملء إقرار الموافقة وموعد التطعيم الفعلي، فيرجى إبلاغ الطبيب/الطبيبة أو معلم/معلمة الصف قبل موعد التطعيم. سيتم إخبارك بموعد التطعيم من قبل المدرسة في الوقت المناسب.

يرجى تزويد طفلك بجميع سجلات التطعيم.

(البطاقة الصحية، دفتر التطعيم، بطاقة التطعيم)

هذا الأمر يسمح للطبيب/الطبيبة بتحديد التطعيم الذي يحتاجه طفلك.

شكراً جزيلاً!