

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКЕ
ПРОТИВ МЕНИНГОКОККОВ А, С, W135 и Y
вакциной Nimenrix®**

Уважаемые родители и лица, их заменяющие!

Австрийский график вакцинации рекомендует прививки против менингококков всем подросткам. Прививка 4-валентной комбинированной конъюгированной вакциной против менингококков групп А, С, W135 и Y бесплатно предлагается детям в 6-м году обучения в рамках программы прививок.

Менингококковые заболевания встречаются во всем мире, однако частота распространения различных групп менингококков, которые вызывают заболевание, варьируется от региона к региону. В Австрии и Европе заболевания чаще всего вызывают серогруппы В и С, хотя серогруппы Y и W135 также иногда регистрируются в случаях заболевания. Серогруппа Y стала значительно чаще встречаться в Северной и Южной Америке, а также в Южной Африке и Южной Азии. В Саудовской Аравии преобладает серогруппа W135. В Африке большинство случаев заболевания вызвано серогруппой А. Она также встречается на Ближнем Востоке, в Азии, Южной Америке и государствах-правопреемниках Советского Союза. В частности, на африканском континенте, в так называемом поясе менингита, время от времени вспыхивают крупные эпидемии. В промышленно развитых странах обычно наблюдаются лишь единичные случаи или небольшие вспышки.

Менингококковые инфекции вызываются бактериями (*Neisseria meningitidis*, менингококки). Они преимущественно встречаются у детей в возрасте до 5 лет и у подростков. В Австрии ежегодно регистрируется около 100 случаев менингококковой инфекции, причем наблюдаются и тяжелые формы. Однако менингококки также могут временно колонизировать носоглотку человека, не вызывая у него заболевания.

Передача инфекции от человека к человеку происходит через выделения из носоглотки. Это означает, что лица, которые являются носителями этих возбудителей на слизистых оболочках носа и горла, могут заразить других, например, при кашле, чихании или поцелуях.

Поэтому передача инфекции происходит в местах, в которых люди имеют очень тесный контакт. Менингококки могут вызывать опасные для жизни заболевания, такие как воспаление мозговой оболочки (менингит) и заражение крови. Через 2-10 дней после заражения появляются такие симптомы, как быстро повышающаяся температура, озноб, рвота, головная боль, ригидность шеи, боли в суставах и мышцах, судороги, светобоязнь и сонливость; они могут возникать отдельно или вместе. Характерно появление красных точечных пятен на коже.

Пожалуйста, см. на обороте, спасибо!

У младенцев и детей младшего возраста симптомы обычно менее характерны: лихорадка, потеря аппетита или рвота, пронзительный плач или хныканье, беспокойство, чувствительность к прикосновениям, ригидность шеи и фиксированное выражение лица. Типичные пятна на коже обычно появляются и у маленьких детей.

Заболевание может вызвать необратимые неврологические поражения. В тяжелых случаях, особенно если лечение начато слишком поздно, менингококковая инфекция может привести и к смерти.

Вакцина против менингококков – это 4-валентная комбинированная конъюгированная вакцина, которая содержит поверхностные компоненты менингококков серогрупп А, С, W135 и Y. После прививки в организме человека вырабатываются защитные вещества (так называемые антитела), которые предотвращают возникновение заболевания в случае инфицирования (заражения) этими возбудителями. Вакцина не защищает от заболеваний, вызванных менингококками группы B. В настоящее время используется 4-валентная комбинированная конъюгированная вакцина против менингококков **Nimenrix®**.

Побочные действия

Как и все лекарства, прививки могут иметь нежелательные побочные действия. К данному информационному листку прилагается инструкция по применению вакцины, в которой содержится информация о составе, возможных противопоказаниях и побочных действиях. Обо всех реакциях и побочных действиях, особенно тех, которые не указаны в этой инструкции по применению, немедленно сообщайте своему врачу.

Проведение прививки

Прививку могут сделать школьные врачи отдела МА 15 только с согласия родителей или лиц, их замещающих. Однако согласие не означает, что Вашему ребенку будет сделана прививка в любом случае. Решение будет принимать врач на основании предоставленной Вами информации.

Если Ваш ребенок болел или получил другие прививки в период между заполнением заявления о согласии и фактической датой проведения прививки, пожалуйста, сообщите об этом врачу или классному руководителю до даты проведения прививки. Школа своевременно сообщит Вам о дате проведения прививки.

ПОЖАЛУЙСТА, ПУСТЬ ВАШ РЕБЕНОК ВОЗЬМЕТ С СОБОЙ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРИВИВКАХ.

(справка о состоянии здоровья, сертификат прививок, карта прививок)

Это позволит врачу определить, какая прививка нужна Вашему ребенку.

СПАСИБО!